

NHS

HPV

vaccination

محافظت در مقابل ویروس پاپیلوم
انسانی (HPV) برای کاهش خطر ابتلا
به سرطان در شما



arm
against
cancer



HPV از نوع عمومی

برنامه ایمن سازی

واکسن HPV بیش از ده سال است که به کلیه دختران دانش آموز در کلاس 8 پیشنهاد می شود. از سپتامبر 2019، این واکسن به پسران کلاس 8 نیز پیشنهاد می شود.

این به آن دلیل است که مستندات به خوبی نشان می دهند که واکسن HPV هم پسران و هم دختران را از ابتلا به سرطانهای مرتبط با HPV محافظت می کند.

واکسن HPV به محافظت از شما در مقابل ابتلا به ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) کمک می کند.

این ویروس خطر ابتلا به برخی سرطانها از نظیر موارد زیر را در آینده افزایش می دهد:

- سرطان دهانه رحم
- برخی سرطانهای دهان و گلو
- برخی سرطان های ناحیه مقعد و آلت تناسلی.


واکسن HPV محافظت در مقابل سایر بیماریهای مقاربتی ایجاد نمی کند.

و نحوه
گسترش آن

HPV

70%


HPV بسیار رایج است. بیش از 70% افراد واکسینه نشده به آن مبتلا خواهند شد




HPV بر روی پوست در کل ناحیه آلت تناسلی و درون آن زندگی می کند، بنابراین استفاده از کاندوم محافظت کامل در مقابل HPV را ارائه نمی دهد.

HPV انواع مختلف دارد.

بیشتر عفونتهای HPV نشانه ای ندارند و خود به خود بهبود می یابند



برخی انواع این بیماری خود به خود بهبود نیافته و می توانند منجر به سرطان شوند در حالیکه برخی دیگر زگیلی در ناحیه تناسلی ایجاد می کنند



تاکنون واکسن HPV چه تفاوتی ایجاد نموده است؟

بیش از 80 میلیون نفر در سراسر دنیا آن را دریافت نموده است.

با گذشت زمان، انتظار می رود این واکسن هر سال جان صدها نفر را در بریتانیا نجات دهد. مطالعات اخیر در اسکاتلند نشان دهنده 71% کاهش در ابتلا به بیماری پیش سرطانی دهانه رحم در زنان جوان می باشد. از آغاز برنامه واکسیناسیون در بریتانیا، تعداد افراد جوان مبتلا به زگیل ناحیه تناسلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

دریافت واکسن HPV

واکسن به بازوی شما تزریق می شود و برای اینکه کاملاً محافظت شوید، نیاز به دو دوز این دارو دارید.

اولین تزریق در کلاس 8، و دومی معمولاً 6 تا 12 ماه بعد انجام می گردد. زمان دریافت دوز بعدی به شما اطلاع داده می شود.

برای ایجاد بهترین محافظت،
واکسن باید پیش از آنکه از لحاظ
جنسی فعال شوید ارائه شود.

اگر از نظر جنسی فعال
هستید نیز باید هنوز هم
واکسینه شوید.



اگر اولین واکسن HPV خود را تا سن 15 سالگی دریافت نکرده باشم چه می شود؟

اگر تا سن 15 سالگی هیچ واکسن HPV دریافت نکرده باشید، نیاز به سه دوز خواهید داشت. این بدان دلیل است که نتیجه دو دوز در پسران و دختران بزرگتر به همان اندازه خوب نبوده است.

دوز دوم تقریباً یک ماه پس از دوز اول داده می شود و یک دوز نهایی نیز حدود شش ماه پس از دوز اول ارائه می شود.

اگر واکسن خود را دریافت نکرده اید باید با تیم ایمن سازی یا درمانگاه خود صحبت کنید تا در اولین فرصت ممکن به شما قرار ملاقات بدهند.

من واکسیناسیون خود را انجام نداده ام، آیا هنوز می توانم آن را دریافت کنم؟

بله. اگر هر کدام از واکسنهای خود را در مدرسه دریافت نکرده اید، تا تولد 25 سالگی می توانید آن را دریافت کنید. در اولین فرصت با پرستار مدرسه یا درمانگاه تماس بگیرید.



زنانی که واکسن را دریافت نموده اند هنوز هم باید برای غربالگری دهانه رحم مراجعه نمایند

به کلیه زنان 25 ساله و بیشتر در انگلستان
آزمایشات غربالگری دهانه رحم ارائه می
شوند.

واکسن از حدود 70% موارد سرطان دهانه
رحم پیشگیری خواهد نمود اما غربالگری
کماکان مورد نیاز است تا سایر ناهنجاریهای
دهانه رحم شناسایی شوند.

سرطانهای دیگر چطور؟

در حال حاضر برنامه غربالگری برای سرطانهای
دیگر مرتبط با HPV وجود ندارد. اگر نگران
هرگونه علائم هستید، با درمانگاه خود تماس
بگیرید.

برای کسب اطلاعات
بیشتر درباره عوارض
جانبی واکسن یا برای
مشاهده دفترچه اطلاعات
بیماران برای واکسن، به
www.nhs.uk/hpv مراجعه
کنید



به یاد داشته باشید

برای دریافت دو دوز واکسن HPV به فاصله حداقل 6 ماه



برای دریافت فوری واکسن HPV، برای محافظت از خود در مقابل سرطانهای متعدد در آینده



در طول زمان، انتظار می رود این واکسن هر سال جان صدها نفر را در بریتانیا نجات دهد.



برای دریافت اطلاعات بیشتر، به اینجا مراجعه کنید

www.nhs.uk/hpv

لیست کامل مواد موجود در واکسن در اینجا ارائه شده است: دفترچه اطلاعات بیمار (PIL):

www.medicines.org.uk/emc/medicine/19033

خلاصه ویژگیهای محصول (SPC):

www.medicines.org.uk/emc/medicine/19016/SPC/gardasil

HPV ACTION.ORG

NHS

این دفترچه توسط اداره بهداشت عمومی انگلستان تهیه شده است.

ایمن سازی، کمک به محافظت همگان در هر سن.