

NHS

HPV

vaccination

د ستاسی د سرطان خطر کمولو لپاره
د HPV ناروغۍ په وړاندې خوندي توب



arm
against
cancer



د واکسین پرو گرام

د HPV واکسین د ښوونځي کال 8، له لسو کال څخه زیات وخت نه نجونو ته ورکول کېږي. له سپټامبر ۲۰۱۹ راهیسې 8 کلنو هلکانو ته هم ورکول کېږي. دا له دې امله دی چې شواهد څرگندوي چې د HPV واکسین هلکان او نجونې د HPV اړوند سرطان څخه ژغورلو کې مرسته کوي.


د HPV واکسین په انساني پاپیلوما وایرس (HPV) اخته کېدو څخه مو خوندي ساتي.

دغه وایرس وروسته بیا د سرطان د ځینو ډولونو لامل ګرځي، لکه:

- د رحم سرطان
 - د خولې او مری سرطان
 - د مقعد او تناسلي برخو سرطان.
- د HPV واکسین له جنسي اړیکو له لارې د خپرېدونکو ناروغيو مخه نه نیسي.


70%

HPV ناروغي ډېره عادي ده. له 7۰٪ څخه ډېر نه واکسين شوي خلک پرې اخته کېږي



HPV په پوټکي او ټول تناسلي اندام او خوا و شا کې ژوند کوي، نو کنډوم کارول په بشپړه توگه له HPV څخه مو خوندي نه ساتي


HPV ډېرې مختلفې بڼې لري



د HPV اکثره ناروغي د نښو رامنځته کېدو لامل نه ګرځي او په خپله بڼه کېږي



ځيني يي نه پاکېږي او د سرطان لامل ګرځېدی شي په داسې حال کې چې نور يي د تناسلي دانو لامل ګرځي



تر اوسه د HPV واکسين خومره اغېزمن ثابت شوی؟

ټوله نړۍ کې له 80 ميليونه څخه ډېر کسان واکسين شوي.

اتکل کېږي چې په خپل وخت به دغه واکسين انگلستان کې په کلنۍ ډول سلگونه تنه وژغوري. يوې وروستۍ اسکاټلينډۍ څېړنې له وړاندې څخه ځوانو مېرمنو کې له سرطان وړاندې د رحم ناروغيو کې 7٪ کموالی ښودلی.

انگلستان کې د واکسين پروگرام له پيل راهيسې جنسي برخو کې دانې لرونکو ځوانانو شمېر کې د پام وړ کمې راغلي.

د HPV واکسين کول

واکسين په مټ کې کېږي او بشپړ خونديتوب لپاره يې بايد دوه ځلي ترسره کړئ.

لومړۍ پېچکارۍ په 8 کلنۍ او دوهمه يې په عام ډول 6 څخه تر 12 مياشتې وروسته کېږي. تاسې ته به دوهمې پېچکارۍ په اړه خبر درکړل شي.

غوره خوندیتوب لپاره، واکسین
باید په جنسي توگه فعاله
کېدو څخه وړاندې ورکړل شي.

که تاسې په جنسي توگه
فعال یاست بیا هم باید
واکسین وکړئ.



که 15 کلنی پوری می د HPV لومړی واکسین ته وی کړی نو څه به وشي؟

که له 15 کلنی وړاندې مو د HPV کوم واکسین نه وي کړی تاسې باید درې ځلي واکسین شئ. دا له دې امله دی چې مشرانو هلاکانو او نجونو کې د دوه ځل واکسین پایلې دومره ښې نه دي.

دوهمه پیچکاري به لومړۍ پیچکاري څخه یو میاشت، او وروستۍ پیچکاري بیا د لومړۍ پیچکاري څخه شپږ میاشتې وروسته کېږي.

که مو خپل واکسین هېر شوی وي باید د واکسین ډلې یا خپل عمومي ډاکټر سره ټومره ژر چې ممکن وي د ملاقات وخت ټاکلو لپاره خبرې وکړئ.

واکسین می قضاء شو، ایا بیا هم واکسین کولی شم؟

هو. که مو ښوونځي کې دواړه واکسینونه ونه کړل تاسې یې تر ۲۵ کلنی پورې کولی شئ. خپل د ښوونځي نرس یا عمومي ډاکټر سره سمدستي تماس ونیسئ.



واکسین شوي مېرمن دي بيا هم بايد د رحم معاینات ترسره کولو ته ځي

انگلستان کې ټول ٢٥ يا ډېر عمر لرونکو مېرمنو ته د رحم معاینات وړاندې کېږي. دغه واکسین به د رحم د سرطان د ٧٠٪ پېښو مخه ونیسي، خو د رحم نورو ستونزو لپاره يي معاینات اړين دي.

د سرطان نورې بڼې په څنگه شي؟

اوسمهال د HPV اړوند نورو سرطانونو لپاره د معایناتو پروگرامونه نشته. که کومو نښو په اړه اندېښمن یاست خپل عمومي ډاکټر سره مشوره وکړئ.

د واکسین جانبي عوارضو په اړه نورو معلوماتو لپاره يا واکسین لپاره د مریض د معلوماتو کتابچې کتلو لپاره www.nhs.uk/hpv ته ولاړ شئ



په یاد ولرئ

چې د 6 میاشتو په فاصلې
سره دوه ځلې واکسین شئ



چې په راتلونکي کې د سرطان
مختلف بڼو څخه خوندي کېدلو
لپاره، ، همدا اوس خپل
واکسین ترلاسه کړئ



اټکل کېږي چې په خپل وخت
به دغه واکسین انګلستان کې
په کلنۍ ډول سلګونه تنه
وژغوري.



نورو معلوماتو لپاره،
www.nhs.uk/hpv څخه لیدنه وکړئ

د واکسین د اجزاو بشپړ لیست لاندې
ادرس څخه موندلی شئ: د مریض د
معلوماتو کتابچه (PIL):

[www.medicines.org.uk/emc/
medicine/19033](http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19033)

د تولید د ځانګړنو لنډیز (SPC):

[www.medicines.org.uk/emc/
/medicine/19016/SPC/gardasil](http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19016/SPC/gardasil)

HPV ACTION.ORG

NHS

دغه کتابچه د انګلستان عامې روغتیا له لوري جوړه شوې ده.
واکسین، هر څوک په هر عمر کې ژغورلو سره مرسته
کوي.